



Charcot-Marie-Tooth Association

PO Box 105 • Glenolden, PA 19036 1-800-606-2682 • Fax: 610-499-9267 info@cmtausa.org • www.cmtausa.org/medicationlist

Wersja polska  
przygotowana przez:



doradofoundation.com

Szanowny pracowniku służby zdrowia:

Jestem osobą cierpiącą na chorobę Charcot-Marie-Tooth, czyli najpowszechniejszą odmianę neuropatii dziedzicznej, występującą u 1 na 2500 ludzi. Jest to choroba o powolnej progresji, prowadząca do uszkodzenia nerwów obwodowych odpowiedzialnych za kontrolę informacji sensorycznych oraz pracy mięśni stóp, dolnej części nóg, dłoni i przedramion.

Okolo 60 stosowanych obecnie leków może stanowić zagrożenie dla osób chorych na neuropatię CMT. Proszę dołączyć poniższą listę do mojej karty pacjenta i mieć na uwadze potencjalne ryzyko, z jakim wiąże się dla mnie przyjmowanie następujących leków:

**Bardzo wysokie ryzyko:**

Alkaloidy barwnika różyczkowego  
(Winkrystyna)  
Taksele (paklitaksel, docetaksel,  
kabazytaksel)

**Ryzyko umiarkowane do znacznego:**

Amiodaron (Cordarone)  
Tritlenek diarszeniku (Trisenox)  
Bortezomib (Velcade)  
Brentuksymab Vedotin (Adcetris)  
Cetuksymab (Erbix)  
Cysplatyna i oksyplatyna  
Kolchicyna (długotrwałe stos.)  
Dapson  
Didanozyna ddl, Videx)  
Kwas dichlorooctowy  
Disulfiram (Antabuse)  
Erybulina (Halaven)  
Fluorochinolony  
Sole złota  
Ipilimumab (Yervoy)  
Iksabepilon (Ixempra)  
Leflunomid (Arava)  
Lenalidomid (Revlimid)  
Metronidazol/Mizonidazol (długotrwałe stos.)  
Nitrofurantoina (Macrochantin,  
Furadantin, Macrobid)  
Tlenek diazotu  
(ryzyko w przypadku nadmiernej inhalacji  
lub niedoborów wit. B12)  
Niwolumab (Opdivo)  
Pembrolizumab (Keytruda)  
Perheksyliina  
Pomalidomid (Pomalyst)  
Pirydoksyna  
(mega-dawki wit. B6)  
Stawudin (d4T, Zerit)  
Suramin  
Talidadomid  
Zalcytabina (ddC, Hivid)

**Ryzyko niepotwierdzone lub niewielkie:**

Fluoroauracyl  
Adriamycyna  
Almityna  
Chlorochina  
Cytarabina (wysokie dawki)  
Etambutol  
Etopozyd (VP-16)  
Gemcytabina  
Gryzeofulwina  
Heksametylmelamina  
Hydralazyna  
Ifosfamid  
Inflixymab Izoniazyd (INH)  
Lansoprazol (Prevacid)  
Meflochina Omeprazol  
(Prilosec)  
Pencylamina  
Fenytoina (Dilantin)  
Podofilina  
Sertralina (Zoloft)  
Statyny  
Takrolimus (FK506, ProGraf)  
Zimeldyna  
Interferon alfa

**Ryzyko pomijalne lub wątpliwe:**

Allopuryinol  
Amitriptylina  
Chloramfenikol  
Chlorprotiksen  
Cymetydyna  
Klichinol  
Klofibrat  
Cyklosporyna A  
Enalapril  
Glutetimid  
Lit  
Fenelzyna  
Propafenon  
Sulfonamidy  
Sulfasalazyna

Organizacja Charcot-Marie-Tooth Association ([www.cmtausa.org](http://www.cmtausa.org)) udziela również dodatkowych informacji na temat potencjalnego oddziaływania leków z powyższej listy oraz wszelkich innych leków na moje zdrowie. Można się z nimi skontaktować pod adresem e-mail: [info@cmtausa.org](mailto:info@cmtausa.org). Dziękuję.